



mise à jour : 10/04/19

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha)
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

| Régions | Apport d'engrais de ferme en été | Reliquats moyens sur 0-60 cm | Reliquats moyens sur 0-90 cm | Nombre analyses* | Reliquats min et max sur 0-90 cm | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| Condroz | Aucun | 24 | 47 | 59 | 9 | 111 |
| | Fumier, compost | 27 | 46 | 32 | 24 | 114 |
| | Fiente, lisier | 29 | 48 | 10 | 26 | 62 |
| Herbagère liégeoise | Aucun | 41 | 78 | 14 | 42 | 120 |
| | Fumier, compost | 48 | 71 | 12 | 19 | 140 |
| | Fiente, lisier | 29 | 73 | 2 | 26 | 62 |
| Limoneuse sèche | Aucun | 34 | 69 | 255 | 9 | 243 |
| | Fumier, compost | 41 | 64 | 145 | 11 | 178 |
| | Fiente, lisier | 54 | 83 | 35 | 29 | 131 |
| Limoneuse humide | Aucun | 39 | 56 | 1 | - | - |
| | Fumier, compost | 39 | 58 | 23 | 18 | 153 |
| | Fiente, lisier | 37 | 54 | 11 | 31 | 137 |
| Sablo limoneuse | Aucun | 41 | 52 | 12 | 28 | 83 |
| | Fumier, compost | 33 | 53 | 30 | 28 | 104 |
| | Fiente, lisier | 59 | 73 | 9 | 20 | 186 |
| Ardenne | Aucun | 37 | 44 | 4 | 37 | 53 |
| Moyenne générale | Aucun | 34 | 65 | 341 | 9 | 243 |
| | Fumier, compost | 39 | 60 | 242 | 11 | 178 |
| | Fiente, lisier | 48 | 72 | 67 | 20 | 186 |

* Si le nombre d'analyse est inférieur à 5, référer vous à une autre région ou à la moyenne générale

