



mise à jour : 14/04/2021

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha)
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	26	34	26	25	10	13	47	61
	Fumier, compost	35	46	35	35	14	16	124	151
	Fientes, lisier	34	44	17	16	17	21	52	72
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	35	47	7	7	17	21	49	73
	Fumier, compost	33	47	8	5	13	28	63	77
	Fientes, lisier	33*	46*	3*	3*	14	22	53	62
Herbagère liégeoise	Aucun	26*	36*	2*	2*	8	16	44	56
Limoneuse humide	Aucun	25	32	17	13	10	14	37	53
	Fumier, compost	33	23*	8	4*	15	20	95	28
	Fientes, lisier	33*	45*	1*	1*	33	45	33	45
Limoneuse sèche	Aucun	30	34	100	44	11	11	112	65
	Fumier, compost	33	51	80	27	7	10	101	138
	Fientes, lisier	38	51	20	11	13	17	75	86
Toutes les régions agricoles	Aucun	29	35	152	91	8	11	112	73
	Fumier, compost	33	47	131	71	7	10	124	151
	Fientes, lisier	36	47	41	31	13	17	75	86
Moyenne générale		31	41	324	193	7	10	124	151

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)