



mise à jour : 14/04/2021

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha)
avec précédent sol nu**

Régions	Précédent	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	betterave	24	31	1*	1*	24	31	24	31
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	35	58	12	6	14	23	83	130
Famenne - Ardenne - Jurassique	betterave	54	79	1*	1*	54	79	54	79
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	38	53	46	39	5	18	99	129
Herbagère liégeoise	betterave	33	43	1*	1*	33	43	33	43
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	36	53	10	10	16	26	60	83
Limoneuse humide	betterave	32	50	7	3*	23	29	43	78
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	35	71	23	7	8	41	71	141
Limoneuse sèche	betterave	29	44	22	10	14	23	54	76
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	33	55	48	26	11	16	74	111
Toutes les régions agricoles	betterave	31	47	32	16	14	23	54	79
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	36	55	139	88	5	16	99	141
Moyenne générale		35	54	171	104	5	16	99	141

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)